

**DE HYDATIDE
INGENTI MOLE
PRAEDITA IN
HEPATE MULIERIS
REPERTA...**

Giuseppe Maule



Med. 4

DE HYDATIDE
INGENTI MOLE PRÆDITA
IN HEPATE MULIERIS

REPERTA

Dissertatio Inauguralis

QUAM

AD MEDICINÆ HONORES RITE ASSEQUENDOS

PUBLICE PROPOQUIT

JOSEPH MAUREL



PATAVII
TYPIS CASTALLINI
1836



Castallini



PRAEFATIO

In tanta rerum medicarum varietate, quae typis commissae medicorum attentionem potissime attrahunt, non infimum sibi locum eae vindicant, quae de anatome pathologica disserunt. Quotidie opuscula publici juris facta hocce in argumento versantur: morborum historiae, autopsiam quoque aegrorum continent; dissectiones diligentissime in Nosocomiis instituuntur, summisque laudibus ii medici cumulantur, qui haud metu perculsi in illis etiam cadaveribus anatomicum cultum injiciunt, quae contagioso morbo perempta in foedissimam saniem liquescunt.

Nec mirum est si hisce temporibus anatomiae pathologicae studium tam

ardenti amore colatur. Hujus enim scientiae auxilio plurimorum morborum indoles detecta fuit, quae jam a densissimis tenebris corripiebatur: ex organorum mechanica abnormitate certissimae causae mortis devinctae fuere, a qua illico aggressi nonnulli aegri perierunt. Nimia oratione uti deberem si tot utilitates ab hoc studio illatas enarrare vellem, et tantam dicam ex hoc, medicum, mortis causam haurire posse etiam in morbis, in quibus aegri debita medendi methodo pertractati nihilominus supremum diem debuerunt obire. Historia praesens, quam vestro iudicio, subjicio, professores spectatissimi, satis superque meam assertionem confirmat. Hepatitis gravissima, quae necem aegræ attulit, atque insignes effectus pathologicos edidit, argumentum mihi suppeditavit ut historiam conscriberem, eamque pro dissertatione in lucem ederem.

Si mei tenuitatem ingenii considerans ab opere satis longo me abstinui, et tantum simplicem historiam exponere vobis curavi, jucundissima spe fretus fui, hoc munus exiguum a vestra benignitate non fore rejectum. Et ita mihi Dii magnam ingenii aciem concesserint, uti illam ad medicas disciplinas augendas impenderem! Hac vero deficiente, et cum aetas juvenilis, atque cognitionum penuria ab iis argumentis pertractandis prohibeant, quae meis equidem viribus nimis grave essent onus, satis contentus fuero si historiam nisi laude, venia tantum excipietis. Quaecunque vero de illa sit sententia, mente semper mihi erit repostam, quod jam celeberrimus Ludovicus Ariosto ediderat:

• *Nè che poco vi dia da impetar seno*

• *Che quanto posso dar, tutto vi dona.*



Aнна Groner, patria paderina, conditione femina, vigintinovem annos nata, mulier temperamento sanguinea, et sat firma corporis compage praedita, nullaque diacrasia conquinata, die vigesima secunda martii anni praeterlapſi in clinicum advecta fuit; mihi vero commissa, illam Hepato-peritonitide, nec non pleuritide laborare dijudicavi. Et re quidem vere ad illum morbum hoc modo enunciandum consideratio nos ducit a symptomatum apparatu desumpta. Loquebantur enim de affectione Hepatis, tensio hypochondrii dexteri, calor summopere adactus, intollerantia tactus, nec non dolor acutus, lancinans in illa regione. Clare evincebant affectionem peritonaei, ac non modo portionis hepatis superficiem externam ventantis, sed et reliqua quoque intollerantia; nampe tactus in caeteris partibus abdominis, tensio quaedam in illo exortis, dolores vagantes, ac deinde vomitiones, vomitus, sive obstipatio, quas peritonitidem comitari solent. Dolor qui in latus dexterum thoracis constanter perdurabat, ac aliquando punctior

ficbat, pleuram quoque dexteram inflammatam esse ostendebat. Opinio haec confirmabatur a difficultate respirationis, ab aegophonia, quas praesertim in latere posteriori dexteri thoracis exaudiebatur. Character morbi inflammatorius per febrim quinque diebus perdurantem, per vultus accensionem, per sitim ac thermogenesisim adiectam, per urinas flammeas, per pulsus suppressos, frequentes ac contractos clare demonstrabatur. Tria itaque viscera ab inflammatione peritonae prebent esse, nempe hepae, peritonaeum et cum pleuram dexteram statuimus. Diaphragma vero, et pulmonem dexterum affectionis illae omnino carere haud dubitavimus, quanquam diaphragmitis, et vere pneumonitis pathognomonica signa desissent, atque hoc ex interpositione et contiguitate cum visceribus inflammatis eruelatur.

Causas vero recensentes, quae morbum illum adeo complicatum producere valuerunt, laboriosam vitae genus, nec non abusus potuum spirituosorum, quibus summo peregre indulgebat antea jam memoravimus. Tamen cum hepatitis a causis internalibus saepe originem ducat, de hisce quoque mentionem facimus, ac de bilitate acrimonia et quantitate adiecta, de calculis felleis, de vermibus hepaticis, nec non de ceteris causis quae hepatitisdem foveant loqui non praetermissimus. Hisce addebamus majorem receptivitatem pro stimulis, quam hepati relinqueret altera in-

flammatio quinque aut annos perpeam. Colligere autem ex aegris paravimus, quod effata hepaticis, tensionem quandam illius abdomini relinquerat, ac dolorem ad hypochondrium dexterum, ad quem sedendam, diu nocturne latera stricto cingulo preeciuncta gerebat; et aegra fortis a vi morbi fracta haec minime recordari potuit. Morbum acutum, ac valde complicatum pertractantes, reservatam prognosim pronuntiandam, et ad curam animo convertio, methodo antiphlogistica, et quidem energice opus esse statimus.

Quare primum ad sanguinis depletiones generales confugimus, quas quinque, uti res postulabat, repetivimus, ita ut quinquaginta sanguinis unciae per venae sectiones evacuerentur, cum jam totidem extractae fuissent antequam in clicum adiecta fuerit; ac centum trigintaquinque hircudines pluribus vicibus adplicatae fuerunt hypochondrio dextero, eidemque quotidie fere cataplasma emolliens appositum. Quotidie quoque ad systematicam cutanei functionem sollicitandam, ac resolutionem morbi hac modo promovendam, decoctum graminis cum tartaro stibiato refracta dosi dedimus. Ab initio usque ad finem fere morbi quotidie quoque aquam coctilem lauro-cerasi ministravimus, cujus sexdecim circiter drachmas consumpsit. Haec coniociamus usum pulverum alterantium Plamerii, quae sectis re-

petitas sunt: et cum cordis palpitationes multum aegrum vexarent, infusam ex vigintiquaque granis foliorum digitalis purpureae interdum cum acetate lixivae confectum septies propinatum fuit. Pariter scopo antiphlogistico, hic acidum alliacum Halleri ad drachmas duas propinabatur. Cum vero nihilominus magis magisque in diem dolor, ac tumor ad regionem hepatis increverent, frictiones illi pluries peractae sunt cum pomata neapolitana, et extracto digitalis purpureae. Mirabamur summopere quod istiusmodi generosissima methodus antiphlogistica inflammationem illam compescere non valeret.

Verum ultimis curae diebus tumor ad hypochondrium incepit fluctuans perventiri, horripilationes, et sudores profusi pluries apparuerunt: urina sedimentum dedit puriforme, et pulsus erant intermittentes, valde molles, ac depressi. Tum sex cucurbitulas, unam post aliam successive abque ulla scarificatione applicavimus. Cum res ita procederet, die septima mensis aprilis, corae decima septima, facies aegri cadaverica, oculi obaerati, respiratio orthopnoica, sudores frigidi compaeruerant. Tum prognosim infamam constituimus, et reversa circa meridiem aegri vehementi orthopnoea prehenditur, de doloribus intolerabilibus ad hepar conqueritur, fortis mitis exclamationes, ac demum manu dolens latus comprimens occumbit. Die subsequa, hora

decima antimeridiana sectio cadaveris instituta fuit, et sequentia reperta.

AUTOPSIA.

Aspectus exterior cadaveris — Tota cutis superficies valde albicans, et quidem tumidula apparet; facies in expressionem doloris informata; rigiditas cadaverica tum in extremitatibus superioribus, tum inferioribus, tum in maxillis: effusio levis seri observabatur in textu cellulari subcutaneo.

Sectio crani — Membranae cerebrum obvolventes, pia mater praesertim, sanguine injecta.

Sectio thoracis — Diaphragma ob volumen hepatis totum elletum erat usque ad secundam circiter costam; pulmones idcirco compressi, et columnae praesertim vertebrae applicati. In cavitate thoracica dextera unciae octo circiter seri quidpiam densi observabantur. Pulmo dexter in partibus inferioribus sanguine aliquantum turgens; et superior, et exterior illius color rubro-lividus. Nil morbosum in praecordia. Pleura pulmonem dexterum obvolvens sanguine injecta videbatur.

Sectio abdominis — In cavo abdominis tres libras fluidi transparentis, aliquantum viridescantis continebantur. Patens erat injectio sanguinis quoque in peritoneo. Hepar diaphragmati per

longas habendas connectebatur; pars dextera illius visceris parietibus abdominalibus nectitur. Hepar ad illud volumen pervenerat, ut hypochondrii dexteri regionem, epigastriū, et etiam hypochondrii sinistri occuparet: color partis dexteræ est albicans, hac illuc membranæ novæ formationis obductam, maxima ex parte albicantibus, vel levi gradu rubris. Tumor aderat in superficie convexa hepatis, qui usque ad ejus limbum inferiorem extendebatur: depressus erat in medio ita, ut duorum tumorum figuram præberet. Volumen ipsius caput parvi adæquabat, ac fluctuans erat. Pondus hepatis hoc in stato ad libras undecim pervenerat. Tumore fluctuante a parte, copiosam quantitatem fluidi serosi flavescens effudit, quod continebatur a membrana albicante, sacci omnino classi formam referente, consistentiæ mollioris, quæ dividi poterat in pluribus stratis, quarum externas angustiora vasis, oculo etiam nudo visibiles, efformabatur. Stratus internus formam membranæ tam mucosæ, tum serosæ manifestabat. Cystis hæc stricta cum hepate adhæsa, illius parenchyma longa compressione deprimebat. Ex hepate habebantur elongabantur magnitudinis dimidii calami scriptorii, quæ pro vasculis sectis, et attente observatio manifestant. Illos diramationes singulares a vena porta oriuntur. Substantia hepatis coloris magis flavicantis, consistentiæ du-

rioris, firmioris, in partibus inferioribus punctulis rubris signata. Parietes cystiferae aliquantum incrassatae, parcam quantitatem fluidi magis ad indolem muci, quam bilis accedentis continebant. Substantia hepatis, cystide adnata, ponderis erat quinque librarum circiter, et quatuor unciarum cum sacco externa: ceterum ponderis quod ad complectendas undecim libras deficit, fluido effuso tribuendum. Diaphragma in involucre suo peritoneali inflammationem per totam extensionem ope pseudo-membranarum manifestabat. Lien per membranas novae formationis partibus circumambientibus adhaerebat. Vascula sanguifera in involucre peritoneali abdominis contenta magis evoluta erant. Inferior superficies intestini tenuis bile est obducta internas flava internas superficies intestinorum crassorum materiem continet magis viridescentem, et injectionem rancosam, sub forme arborisationis manifestae. Levis quantitas seri observabatur collecta in cellulari subcutaneo extremitatum inferiorum.

IN AUTOPSIAM ANIMAEVERENDI.

Diagnosim nostram ab iis, quae in cadavere inventa sunt, confirmatam fuisse nemo in dubium revocare potest. Diximus enim inflammatione praebendi et hepatis, et peritonaeum, et pleuram. Membranas novae formationis obrepentes su-

perficiem externam hepatis, habundans, quae ex eodem emittebatur, quae nil aliud esse nisi continuationes vasorum a vena porta provenientibus attenta observatio manifestavit. Substantia hepatis coloreis flavicantis, consistentiae durioris, firmioris, in partibus inferioribus punctis rubris conspersis, ac in volumine adacta, viscus illud vehementi inflammatione laborasse demonstrat. Nam per hanc solummodo transformatio materiei organicae exoritur, et ab hac tantum pseudomembranas originem repetunt. Idem quoque dicendum de peritonaeo, quod hepati stricte adhaerebat, cujusque vasa sanguifera valde injecta videbantur, idemque asserere possumus de pleura, cujus vasa eodem statu, ac illa peritonaei inveniebantur. Pariter praeter hepatitis, phrenitis quoque, et inflammatio pulmonis dexteri, quae in statuenda diagnosi exarabamus, confirmatae fuerant; nam et diaphragma, et lobus inferior pulmonis dexteri signa perpeuae inflammationis praesentabant. Ab Hydatide in superficie externa hepatis inventa, causa complicatae inflammationis, repetenda mihi videtur. Nam illa corporis extremi officium praestabat; perturbationem praeterea in systemate circulatorio, et respiratorio, et hepati ipso pressionem continuam inferrebat, tandem effectum est, quod et generosis sanguinis evacuationibus, et furcioribus remediis antiphlogisticis inflammatio resisteret. Neque ullo modo obtundi

poterat, nisi prius causa attenta fuisset. Haec autem quando etiam cognosci possit, quod certe summo peregrino difficile est, amoveri non debet: nam illius evacuatio per incisionem externam peractam, vel utramvis concessa citius movent auctores, necesse accelerat. Verum si semper dictum fuit, quod hydatides perfecte simulant aliquando inflammationem, aliquando abcessum hepatis, hoc praetertim vidimus in casu nostro, quo cum revera adhaeret inflammatio, huic postea omnia symptomata, quae suppurationem hepatis comitari solent, consociabantur.

DE HYDATIDE.

Nomine Hydatidis saeculo praeterlapso vermes vesiculares, tumoresque cystici donabantur. Accuratas Hartmanni, et Tysonii observationes apprime hydatidum vitam detexerunt. Ac inde Linnæus eandem posuit inter zoophita in genere Thœnia. Per aliquod temporis spatium classificatio hæc retenta fuit a celeberrimis Blok, Verner, et aliis; tandem Zeder, Rudolphi, Sutter, et Lænnec quinque genera de illis efformarunt, nempe:

- 1.^o *Accephalocystidium*, in quibus nulla adest distinctio inter caput, et corpus (Lænnec).
- 2.^o *Cuticercarum*, in quibus corpus est quasi cylindricum, vel aliquantum compressum, rugo-

sum, fissura cum vena caudali ab uno latere, et ab alio cum capite, cujus basis praedita est quatuor papillis ad suctionem datis (*Rodolphi*).

3.^a *Ditrachacarorum*, in quibus corpus est ovale, compressum, involutum in tunica quadam laxa, et finitum a capite, quod a duobus appendicibus operitur, et curvata aetia (*Sulzer*).

4.^a *Echinococcorum*, qui una tantum vesica caudali multis corporibus communi, et sola corone uncorum, absque papillis exsurgentibus constituntur (*Rodolphi*).

5.^a *Polycapbalarum*, quarum corpus est oblongum, cylindricum, rugosum, a vesica pluribus individuis communi terminatum, cujus caput papillis exsurgentibus, et duobus coronis uncorum praeditum est (*Zeder*).

Hydatidis nostrae, quae absque capite, et cauda inveniebatur, ad *Acephalocystides* spectare clarescit, nampe ad genus illud a *Laennecio* descriptum. Quomodo esse efformaverit corpus illud vite donatum inter hepatis, et peritoneum, arduum inquirere est. Nec explicari potest, nisi per generationem equivocam, cui ferum impulsum hepatitis quinquae ante annos perperam praestavit. Opinio querenda, quae hydatides producta inflammationis esse vult, omnino fallax; nam inflammationi non competit vitam corporibus donare, et sola facultate modificandi materiam organicam praedita est; cumque nemo dare possit,

quod non habet, minime credendum, quod ab inflammatione hydatides originem doceant. Tantum inflammatio, uti superius dixi, potest esse causa occasionalis evolutionem earundem determinans. Hydatis in Anna Cromer ante quinque annos originem duxerat, vitam propellam vixit in ejusdem organismo, ac in diem increvit ad gradum illum, quo proprio volumine laethalia phaenomena tulit.

Ab observatione decursus morbi hujusce, duae praecipue considerationes deduci possunt nempe: 1.^a Hepatis hydatis inflammationem visceris ejusdem inferens, propria fluctuatione ita perfecte simulare potest hepatis suppurationem, ut difficillimum sit de ipsius presentia, vel de hepatis suppuratione judicium, ferre. 2.^a Per Hydatidem, in hepate existentem, morbus incurabilis constituitur, et ipsius evacuatio per incisionem externam peracis mortem accelerat.

EPICRISIS.

Hinc igitur de Hydatide exposita, potestas ante nonnulla verba de conditione pathologica dicere, quae ad Hydatides promovendas maximum influxum euserit. Quam disquisitionem aggre-
diens band parva praemii difficultate argumentum videtur. Pathologi enim inter se adhuc certant de causa proxima hydatidum, et dom-

nonnulli a phlogosi illam repetunt, alii e contra a prava nutritione evincunt. Medici Galli inter quos quidam Roche, et Sanson haud infimum tenent locum, in ea sunt sententia, ut Hydatidem originem ab organi irritatione dependere existiment in quo evascentur.

Valendum attamen est an haec idea veritati ita respondeat ut admitti debeat. Irritatio in se ipsa considerata nil aliud exprimit, nisi aliquid eos quod organo adplicatum illud laesit, atque ad inflammationem disponit. Inflammatio vero confundi ne poterit cum simplici irritatione sicuti praedicant Roche, et Sanson, ceterique illius systematis sectatores? Nobis quidem haec sententiae accedere haud videtur. Nemo inflictebitur procul dubio inflammationem e simplici irritatione longe distare, et quisquis inflammationis naturam respiciat, de hac veritate certior evadit. Vera phlogosis jam novos productus in organo edit in quo exardescit, nec cessat donec methodo antiphlogistica energica exhibeatur. Irritatio e contra eo usque perdurat quo causa irritans adest, et illico evanescit statim ac illa abigitur.

Organa inflammatione deprehensa etiam si ad priusnam valetudinem restituantur, nunquam, vel fere nunquam ita componuntur, ut perfecte functiones exerant. Irritatio fibras alicujus organi laedens affluxum majorem sanguinis ibidem pro-

vacat, sed hoc non sufficit ad desorganisationes efficiendas, quae in vera inflammatione contingere solent. Haec in casu unico tantum elementum phlogosae habebimus juxta eximii Bonalini sententiam, tum caetera nempe plastassia, atque angiocinetis omnino absunt.

Hisce breviter characteribus enumeratis, atque discrimine notato quod inter irritationem, ac veram phlogosin interest ex se clare patet hydatidem originem ab irritatione haud dependere. Inflammatio igitur erit ne vera eorundem causa? Si inflammationis indoles in conspectum venit, quae ad novos productus fovendos inservit, existimaretur hydatides quoque a phlogosi originem trahere. Suppositio haec est quam facta omnino redarguit. Saepissime enim hepatitis locum habuit, et secto cadavere nulla Hydatidis reperta fuit, dum e contra hi productus appaeruerunt absque ulla phlogosae nota praegressa. Hoc quid significat? Nil aliud certe, nisi ab alio processu morbifero haec productiones procedere. Non certe a lenta, atque obacurata inflammatione repetere illas fas erit, cum hujusmodi symptomata omnino absint, nec palam jam facta sint. Quaecumque igitur rationi magis consona causa proxima erit Hydatidem?

Ad hanc questionem solvendam censui est diligenter attendendum, quae ad promovendas cystas influxum quam maximam exerunt, inter

quae praecipuum sibi locum vindicant lapsae, nec non ictus in hypochondrio dextero illatus. Haec praemissis ut clare phaenomeni ratio explicatur. Dispositiones enim praesunt in illo organo ad molem augendam, atque ibidem majori sanguinis quantitate, quam per se collecta, distensio membranarum oritur, atque lenta vasorum efformatio quae paulatim in habentibus membranaceas coalescent, atque rudimentum organicum porrigunt.

Hoc efformato, organum novum instituitur, quod paulatim incrementa, atque molem acquirit, proxima vias mechanice laedit. Sanguinis circuitum perturbat, talique pacto lentas nec non rebelles phlogoses edit. Nec mirum mihi videtur, quod haec inflammatio tam cito finem absolvat. Hydatidis enim mole in thorace casum magis angustum reddit, talique pacto respirationem retardat, atque omnino impedit. Phlogosis vero hepatis secundaria dici debet, et effectus Hydatidis erit consideranda. Hoc modo ut clare phaenomenon explicatur, nullaque hypothesi superstruitur. Haec igitur considerandi ratio quoad Hydatidum efformationem illa erit, quam retinebimus, quin et toto fundamento innititur, nullamque hypothesin continet.

THESES DEPENDENDAE

I.

In convulsionibus infantum melius est curare nutricem quam infantem.

II.

Hepar non tam ad bilis separationem inservit, quam etiam ad sanguinis massam dephlogisticandam.

III.

Nervorum cerebralium officium, ab officio illorum ganglienicorum satis distat.

IV.

Divisio morborum in hypostenicos, atque hyperstenicos a nonnullis pathologis haud admit-
titur.

V.

In morbis digressendis ad symptomatum complexum quem maxime attendere oportet.

VI.

Aurum inter metalla difficiliter oxydationem subit.

VII.

Difficile veneficium abigitur cum in corpus humanum proprios effectus exercit.

VIII.

Venae sectio in peripneumonia ita dicta notha quam maxime damanda.

IX.

Amaroroda nunquam, vel fere nunquam sanatur cum rectius abnormitate dependet.

X.

Arsenicum, ejusque praeparata damnum potius, quam levamen aegris attulerunt.

XI.

Air sicca, atque frigidus quam maxime inflammationibus favet.

XII.

Febris perniciosa nunquam sanata fuerunt, nisi chinae subministrations.

99 - 37115

